

Välkommen till AFA Försäkrings webinarium 23 oktober 2020

Arbetsskador och sjukfrånvaro i vårdyrken

Medverkande:

Elin Henriksson

Analytiker och statistiker, AFA Försäkring


Andreas Ek

Analytiker och statistiker, AFA Försäkring

Moderator:

Anna Weigelt


Chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring

- Webbinariet börjar klockan 9:00
- Se till så att du har ljudet påslaget – lyssna så du hör bakgrundsmusiken
- Tekniska frågor kan ni skicka i chatten genom att klicka på  Vi försöker hjälpa er i största möjliga mån.
- Ni kan ställa frågor till föreläsaren genom att klicka på Q&A  Dessa kommer besvaras i slutet av webinariet.
- En länk till det inspelade webinariet kommer skickas ut i efterhand.


Musik: <https://www.bensound.com>



Bakgrund: om vården



- Läkare
- Sjuksköterskor och barnmorskor
- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.



Försäkringarna omfattar:


	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Regioner	Staten
Arbetsskador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjukfrånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	---

Arbets-skador

- Arbetsolycksfall
 - Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet
- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall


Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning




Allvarliga arbetsolycksfall

Antal godkända *allvarliga* arbetsolycksfall inom vården, 2015–2018




Risk för *allvarliga* arbetsolycksfall över tid

Yrkesgrupp



- Total
- Läkare
- Sjuksköterskor och barnmorskor
- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.


Kön



- Sjuksköterskor och barnmorskor, Kvinnor
- Sjuksköterskor och barnmorskor, Män
- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl., Kvinnor
- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl., Män

Risk för *allvarliga* arbetsolycksfall per yrkesundergrupp

Genomsnitt 2016-2018



■ Sjuksköterskor och barnmorskor

■ Grundutbildade sjuksköterskor

■ Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

■ Undersköterskor

■ Läkare

■ Biomedicinska analytiker, tekniker m.fl.


■ Specialistsjuksköterskor

■ Personliga assistenter


■ Vårdbiträden, skötare, vårdare och boendestödjare

Risk för *allvarliga* arbetsolycksfall per åldersgrupp


Genomsnitt 2016-2018



De vanligaste orsakerna till *allvarliga* arbetsolycksfall, 2015-2018




De vanligaste orsakerna till *allvarliga* arbetsolycksfall per yrkesgrupp, 2015-2018



- Hot och våld
- Olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient (ej hot eller våld)
- Ramla ute
- Ramla inne
- Fall i trappa
- Cykel
- Risk för smitta (ej i samband med hot eller våld)
- Övriga händelser

Överrisk inom vården för *allvarliga* arbetsolycksfall efter händelsetyp, 2015-2018

Antal allvarliga
olycksfall



Exempel på händelseförlopp

Kvinna, 56–64 år
Specialistläkare

"Jag halkade på väg till ett äldreboende."

Diagnos:

Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet.

Allvarlighet:

Medicinsk invaliditet.



Kvinna, 36–45 år
Grundutbildade sjuksköterskor

*"Ska lägga ned använd kanyl i riskavfall.
En använd kanyl sticker upp och jag sticker mig på fingret."*

Diagnos:

Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar.

Skadeallvar:

Sjukskriven >30 dagar.



Exempel på händelseförlopp

Kvinna, 46–55 år
*Undersköterskor, hemtjänst,
hemsjukvård och äldreboende*

"När den boende tappar balansen, stöter han/hon sin armbåge och sitt rullatorhandtag i min bröstorg."

Diagnos:
Fraktur på revben.

Allvarlighet:
Sjukskriven > 30 dagar.



Man, 56–64 år
Vårdare, boendestödjare

"Blev slagen och biten av klient. När jag kom loss och var bakom klienten blev jag skallad så att underläppen sprack."


Diagnos:
Sårskada på läpp och i munhåla.

Allvarlighet:
Medicinsk invaliditet.




Var på kroppen sker skadorna?

Sjuksköterskor och barnmorskor




Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.




Arbetssjukdomar

- En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA Försäkring krävs att besvären har **kvarstått i minst 180 dagar** och den är **godkänd av Försäkringskassan** eller finns med på **ILO-förteckningen** över arbetssjukdomar

Godkända arbetssjukdomar med insjuknandeår 2014-2019



Godkända arbetssjukdomar med insjuknandeår 2014-2019 efter diagnos och yrkesgrupp



Långvarig sjukfrånvaro

Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning

Försäkringarna omfattar:


	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Regioner	Staten
Arbets-skador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjukfrånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	---

Vårdanställda inom statlig och privat sektor ingår inte i avsnittet om långvarig sjukfrånvaro som avser personer som fått ersättning från AGS-KL.


Antal långa sjukfall per år inom vårddyrken

Kommuner och regioner

Kvinnor



Män



— Läkare


— Sjuksköterskor och barnmorskor

— Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.


Risk för långvarig sjukfrånvaro över tid

Kommuner och regioner

Kvinnor



Män




- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
- Sjuksköterskor och barnmorskor
- Läkare
- Samtliga i kommuner och regioner


Risk för långvarig sjukfrånvaro per åldersgrupp

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Kommuner och regioner

Kvinnor




Män




— Under 36 år — 36-45 år — 46-55 år — 56-64 år — Samtliga

Risk för långvarig sjukfrånvaro per åldersgrupp. Sjuksköterskor och barnmorskor, Kommuner och regioner

Kvinnor



Män




— Under 36 år — 36-45 år — 46-55 år — 56-64 år — Samtliga


Risk för långvarig sjukfrånvaro per åldersgrupp.

Läkare, Kommuner och regioner

Kvinnor




Män





Under 36 år 36-45 år 46-55 år 56-64 år Samtliga

Risk för långvarig sjukfrånvaro per yrkesundergrupp. Kommuner och regioner, snitt 2016-2018.



Medianlängd för långa sjukfall över tid

Kommuner och regioner



— Läkare

— Sjuksköterskor och barnmorskor

— Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

De vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro. Kommuner och regioner, 2016-2018.

Kvinnor, Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.



Kvinnor, Sjuksköterskor och barnmorskor


Kvinnor, Läkare

Män, Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.



Män, Sjuksköterskor och barnmorskor

Män, Läkare



Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99)





- **Ledsjukdomar**
- **Ryggsjukdomar**
- **Sjukdomar i mjukvävnader**
- Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
- Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
- Inflammatoriska systemsjukdomar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (M00-M99)

Psykiska sjukdomar (F00-F99)




- **Förstämmningssyndrom (t.ex. depression)**
- **Anpassningsstörning och Reaktion på svår stress**
- **Ångestsyndrom**
- Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (F00-F99)
- Sorgereaktion
- Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser

Risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos över tid. Kommuner och regioner.




- Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
- Sjuksköterskor och barnmorskor
- Läkare
- Samtliga i kommuner och regioner


Risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos per ålder. Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl., genomsnitt 2016–2018. Kommuner och regioner.



Risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos per ålder. Sjuksköterskor och barnmorskor, genomsnitt 2016–2018. Kommuner och regioner.




Risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos per ålder. Läkare, genomsnitt 2016–2018. Kommuner och regioner.



Två typer av psykiska diagnoser dominerar

Risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, snitt 2016-2018



Sammanfattning långvarig sjukfrånvaro

- Kvinnor inom vården har klart högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män inom samma åldersgrupp och yrke.
- Kvinnliga *undersköterskor* har den högsta risken för långvarig sjukfrånvaro inom vården. Manliga *läkare* har den lägsta risken.
- *Psykiska diagnoser* är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom vården.
- Av de psykiska diagnoserna är *reaktion på svår stress* vanligast. Kvinnor inom vården har tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av *reaktion på svår stress* än män inom samma yrke.

Sammanfattning, arbetsskador

- *Läkare och sjuksköterskor och barnmorskor* har lägre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden.
- *Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.* har högre risk än genomsnittet
- *Fallolyckor* är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall inom vården.
- Inom vården är det vanligare än inom andra yrkesgrupper att *hot och våld* och *olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient (ej hot eller våld)* är orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall.
- De vanligaste orsakerna bakom godkända arbetssjukdomar inom vården är *psykiska sjukdomar och syndrom* och *hudens sjukdomar*

Tack för att ni lyssnade!

<https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/>

- Denna rapport
- Tidigare rapporter
- Prenumerera på våra rapporter
- Film om skadedatabasen
- Kontaktuppgifter